

FIST GOLD®



EKİM ÖNCESİ UYGULAMA

- İlaçlama sonrası tırmıkla veya diskaro ile toprağın 5-8 cm'lik kısmı karıştırılıp tapan-sürgü çekilmelidir.
- Kısa süre içerisinde toprağa karıştırma zorunluluğu yoktur (3-4 gün içerisinde yapılabilir).
- Kurak şartlarda FIST GOLD® uygulamasını takip eden 3-7 gün içerisinde 5-10 mm sulama yapılmaktadır.

ÇIKIŞ ÖNCESİ

- İlaçlama; Ekim sonrası fide çıkışlarından önce yapılır.
- Toprak neminin yeterli miktarda olması gerekir.



KONTROL ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ YABANCI OT TÜRLERİ



Horoz ibiği



Tilki kuyruğu



Köpek üzümü



Yabani semiz otu



Sirken



Çoban çantası



Kirpi darı



Benekli darı



Yabani yulaf

Ürün Geliştirme Müdürü
Burak Uğurer 0538 257 42 69

Ege Bölgesi Satış Temsilcisi
Cumhur Durgan 0538 057 34 06

İç Anadolu Bölgesi Satış Temsilcisi
Bera Palalı 0538 035 48 76

Ürün Geliştirme Müdürü
Erdal Eraydın 0532 131 10 13

Marmara Bölgesi Satış Temsilcisi
Ulaş Uysal 0538 035 51 04

Antalya Bölgesi Satış Temsilcisi
Mustafa Ali Tıgılı 0538 683 54 11

Ürün Geliştirme Müdürü
Murat Ergül 0533 573 23 80

Karadeniz Bölgesi Satış Temsilcisi
Ahmet Rasim Serdaroğlu 0538 257 59 71

GAP Bölgesi Satış Temsilcisi
Ramazan Sezer 0538 035 44 40

@uplturkey

@upl.turkey



UPL Ziraat ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers No: 47B A Kule Kat: 31 D: 3107
35530 Bayraklı / İZMİR T: 0232. 446 57 89 - 90 F: 0232. 489 04 82 www.upl-ltd.com/tr

Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini okuyunuz.

Telif Hakkı © 2022 UPL. Tüm Hakları Saklıdır. FIST GOLD®, UPL logo ve OpenAg™, United Phosphorus Limited şirketinin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.

FIST GOLD®

Etkili Madde: 450 g/l Pendimethalin
Formülasyon Şekli: Kapsül Süspansiyon (CS)
Grubu: K1 HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)



Ambalaj:
1L & 5L & 10L

H E R B İ S İ T



**YENİ NESİL MİKRO KAPSÜL TEKNOLOJİSİ İLE
YABANCI OT KONTROLÜNDE
UZUN SÜRELİ, ANİ VE GÜVENİLİR ÇÖZÜM**

Daha fazlası için

www.upl-ltd.com/tr



FIST GOLD®

FIST GOLD®'un etken maddesi olan Pendimethalin; 1970'li yıllardan beri kullanılan seçici bir herbisittir.

Çok geniş bir kullanım alanı vardır. Hububat, soya fasulyesi, pamuk, çeltik, patates ve sebze başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.


Dar ve geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde çok çeşitli ot kontrolüne sahip bir herbisittir.



HERBİSİT

MİKRO KAPSÜLÜN AVANTAJLARI

- Uygulama maliyetlerini ciddi anlamda düşürür.
- Çok iyi koruma süresi ile, diğer formülasyonlara oranla daha uzun koruma sağlar.
- Kullanıcıya karşı diğer formülasyonlara göre çok daha düşük toksisite sağlar.
- Çevreye karşı daha duyarlıdır.
- Değişken su pH'larında daha stabil kalabilir.



KULLANMA ŞEKLİ

Soğan

FIST GOLD®, iyi hazırlanmış keseklerden, yabancı otlardan ve daha önce ekilmiş bitkilerin artıklarından temizlenmiş olan toprağa, soğan ekiminden sonra çıkış öncesi uygulanır.

Pamuk

FIST GOLD®, ekim öncesinde tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra hemen veya en geç 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırmaya gerek yoktur.

Havuç, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Fasulye, Anason

FIST GOLD®, ekimden hemen sonra, yabancı otlar çıkış yapmadan (çıkış öncesi) uygulanmalıdır.

Tütün

FIST GOLD®, tütün dikiminden hemen önce, yabancı otlar çıkış yapmadan (dikim öncesi) uygulanmalıdır.

Yonca

FIST GOLD®, yonca biçildikten sonra, sürgün gözler patlamadan önce uygulanmalıdır.

Nohut

FIST GOLD®, nohut ekiminden sonra, toprak üzerine kaplama yapılarak uygulanmalıdır.

Kurak şartlarda FIST GOLD® uygulamasını takip eden 3-7 gün içerisinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

Münavebe Bitkileri

Hemen ekilebilecek bitkiler; Pamuk, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler. 6 ay sonra diğer bitkiler ekilebilir.

Uygulama yapılmış tarlanın herhangi bir nedenle bozulması halinde: Toprak 15 cm işlenerek: Buğday, arpa, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye

Toprak işlenmeden: Mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.

Fitotoksite: FIST GOLD® hastalık, kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fitotoksiste yapabilir.

ÖZELLİKLERİ

Geniş yabancı ot yelpazesi
Formülasyon (CS)
Esnek uygulama zamanı
Geniş ürün yelpazesi

FAYDALARI

Dar ve geniş yapraklı yabancı otlara etki
Uzun süreli etki, olumsuz çevre koşullarına direnç
Ekim öncesi veya çıkış öncesi uygulama
Pamuktan ayçiçeğine, soğandan fasulye'ye kadar geniş ruhsat

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCI OT ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	PHI (GÜN)
 SOĞAN	Adana pancarı (<i>Beta adanensis</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi	-
 PAMUK	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hanim döşegi (<i>Euphorbia prostrata</i>) Hint keneviri (<i>Corchorus olitorius</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Yeşil horozibiği (<i>Amaranthus viridis</i>)	300 ml/da Ekim öncesi	-
 MISIR	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi	90
 AYÇİÇEĞİ	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Horozibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Köpeküzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Yeşil horozibiği (<i>Amaranthus viridis</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi	-
 HAVUÇ	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi	-
 ANASON	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Arap baklası (<i>Vaccaria pyramidata</i>) Duvar kazayağı (<i>Chenopodium murale</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi	-
 SOYA	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkanot (<i>Setaria verticillata</i>) Gri lekeli amarant (<i>Amaranthus lividus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi	-
 FASULYE	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Köpeküzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Yeşil horozibiği (<i>Amaranthus viridis</i>) Yapışkanot (<i>Setaria verticillata</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi	-
 TÜTÜN	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Dikenli eşek marulu (<i>Sonchus asper</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Köpeküzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce, dikim öncesi	-
 YONCA	Küsküt (<i>Cuscuta campestris</i>)	300 ml/da Yonca biçildikten sonra, sürgün gözler patlamadan önce	-
 NOHUT	Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Yeşil horoz ibiği (<i>Amaranthus viridis</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>) Yatık Sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Köpeküzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra	-